

Je me suis piqué(e)!

Mesures à prendre lors d'une exposition accidentelle au sang ou à d'autres liquides biologiques

Mesures immédiates

Piqûres, coupures, éraflures, morsures

- Lavage de la plaie à l'eau et au savon
- Désinfection p.ex. avec de l'alcool à 70 %

Projection sur les muqueuses (bouche, nez, yeux)

- Rincer abondamment à l'eau ou avec une solution physiologique

Contact avec la peau lésée (ulcérations, exanthème, etc.)

- Lavage à l'eau et au savon
 - Désinfection p.ex. avec de l'alcool à 70 %
-

Annonce immédiate

Au supérieur

Au médecin compétent (service médical du personnel, urgences)

- Jour:
 - Nuit ou week-end:
-

Mesures médicales urgentes

Le médecin compétent prendra immédiatement les mesures suivantes:

- analyse du risque infectieux
 - début immédiat d'une chimioprophylaxie anti-VIH, selon la situation
 - contrôle du statut vaccinal concernant l'hépatite B
 - dosage des anticorps (VIH, hépatite B et C); éventuellement dosage des transaminases
 - si nécessaire, poursuite de la PEP anti-VIH et administration d'immunoglobulines anti-HBV ou rappel vaccinal
-

Ne perdez pas de temps!

Centres de référence pour la prévention des infections transmises par voie sanguine dans le secteur sanitaire:
CHUV Lausanne, Hôpital universitaire de Zurich

Infos complémentaires

Prévention des maladies infectieuses transmises par voie sanguine dans le secteur sanitaire:

www.suva.ch/2869/30.f

Renseignements téléphoniques

Centre de référence pour la prévention des infections transmises par voie sanguine:
CHUV Lausanne, tél. 021 314 02 75